

À Rabat le 09 Avril 2026

TITRE :

Chapitre XXVIII : Fondements mathématiques du paradigme de Rachid ELAÏDI – Équation maîtresse, barrière, originalité et émergence des éléments chimiques

Auteur : Rachid ELAÏDI
Affiliation : chercheur indépendant
09 Avril 2026*

Résumé

Ce chapitre présente une synthèse mathématique rigoureuse du paradigme de Rachid ELAÏDI. Nous y développons l'équation maîtresse unifiée (avec termes continus et discrets, pics de Dirac), la notion de barrière probabiliste (ligne de démarcation entre éléments originels et composés), la classification des éléments chimiques du TP_Rachid ELAÏDI (Ne, H, H_2O, U238, etc.) selon leur probabilité d'originalité, et les mécanismes d'émergence dans le monde visible (signatures spectrales, intensités, dangerosité). L'arbre de Rachid modulo π structure les bifurcations, tandis que les combinaisons scalaires $\oplus$ modélisent les accumulations constructives ou destructives. Une interprétation physique et chimique accompagne chaque développement mathématique. Ce chapitre constitue une base pour les simulations numériques et les futures expériences.

Mots-clés : équation maîtresse, barrière probabiliste, originalité, pics de Dirac, arbre modulo π, combinaison scalaire, émergence, signature spectrale.

---

1. Introduction

Le paradigme de Rachid ELAÏDI postule que le monde visible est une projection d'un monde invisible structuré : l'Espace Rachid ELAÏDI (ERE). Les éléments chimiques sont des **programmes** évoluant selon une **équation maîtresse** paramétrée. Ce chapitre unifie les développements précédents en un formalisme mathématique cohérent, et propose une classification des éléments en « originels » (sans antécédent dans l'échantillon) et « composés » (issus de combinaisons) à l'aide d'une **barrière probabiliste**.

---

2. L'équation maîtresse unifiée

2.1 Variables d'état

L'état d'un programme γ est décrit par un vecteur de huit constantes réelles :

$$\Theta = (A, B, C, D, E, F, G, H) \in \mathbb{R}^8$$



ainsi que par une **probabilité de visibilité** $p(T)$, une **énergie cumulée** $E(T)$, une **intensité** $I(T)$ et une **chiralité** $X(T)$. Le temps T est le **temps de Rachid** (temps profond de l'ERE).

2.2 Équations d'évolution

Le système d'équations différentielles ordinaires avec termes impulsionnels (pics de Dirac) est (une suggestion) :

$$\frac{dT}{dp} = Ap(1 - Bp) + C\sin(DT + E)p(1 - p) + Fe - GT\cos(HT)p + k\sum \Delta p_k \delta(T - T_k),$$
$$= \alpha A + \beta\gamma(T) + \delta I - \lambda E + k\sum \Delta E_k \delta(T - T_k),$$
$$= \eta p - \mu I + \nu\gamma(T) + k\sum \Delta I_k \delta(T - T_k),$$
$$= (\kappa - \xi)X + k\sum \Delta X_k \delta(T - T_k),$$
$$= k\sum \Delta D_k \delta(T - T_k), \quad \frac{dT}{dH} = k\sum \Delta H_k \delta(T - T_k).$$

Les termes $\delta(T-T_k)$ sont des **pics de Dirac** modélisant les chocs et bifurcations instantanés. Les incréments ΔU_k sont proportionnels au facteur de Lorentz $\gamma_k = 1/\sqrt{1 - v_k^2/c^2} - 1$ des sans-masse incidents (vitesses supraluminiques).

Interprétation physique :

- $\rho(T)$: probabilité que l'élément soit observable dans le monde visible.
- $E(T)$: énergie stockée (chaleur, potentiel chimique).
- $I(T)$: intensité du signal (amplitude spectrale).

- $\chi(T)$: chiralité (gauche/droite).

- Les pics de Dirac représentent des événements soudains : collisions entre molécules, changements d'état, réactions chimiques instantanées.

Interprétation chimique :

- A: taux de réaction (cinétique).
- DH: fréquences vibrationnelles (spectroscopie IR, UV).
- Les sauts ΔD_k correspondent à des changements de conformation moléculaire (isomérisation).

3. Arbre de Rachid modulo π

L'arbre de Rachid $T=(S,A,\sim)$ est un graphe orienté où chaque nœud s correspond à un programme stable. Les arcs représentent des bifurcations possibles. La probabilité d'emprunter un arc a depuis s est $P(s)(a)$. La relation d'équivalence $\sim$ identifie les nœuds séparés par un multiple entier de π (périodicité angulaire).

Interprétation :

- L'arbre représente l'ensemble des voies réactionnelles possibles.
- Les probabilités $P(s)(a)$ sont les constantes de vitesse relatives.
- La périodicité modulo π reflète la symétrie des phases en chimie quantique.

---

4. Combinaisons scalaires et barrière d'originalité

4.1 Somme scalaire $\oplus$

Pour deux programmes γ_1, γ_2 d'intensités I_1, I_2 et de phases ϕ_1, ϕ_2, leur combinaison (fusion) est définie par :

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\phi_1 - \phi_2).$$

L'opération $\oplus$ est non commutative et non associative. Elle modélise l'**accumulation constructive** (cos positif) ou **destructive** (cos négatif).

Interprétation physique : interférence d'ondes (optique, acoustique).
Interprétation chimique : liaisons chimiques (orbitales en phase ou en opposition), réactions de synthèse ou de décomposition.

4.2 Probabilité d'originalité

Pour un élément γ donné, on définit la **probabilité d'être composé** comme la probabilité qu'il puisse s'écrire comme combinaison d'autres éléments d'un échantillon S:

$$P_{\text{comp}}(\gamma) = \min_{\{w_i, \phi_i\}_{\gamma_i \in S}} \|\sigma_\gamma\|_2 \|\sigma_\gamma - \sum_i w_i \sigma_i\|_2,$$



où $\sigma(\omega)$ est la signature spectrale (transformée de Rachid). La **probabilité d'originalité** est $P_{\text{orig}} = 1 - P_{\text{comp}}$.

Interprétation : un élément est original s'il n'est pas une simple combinaison d'autres éléments connus (par exemple, les gaz rares sont originels, les molécules comme H_2O sont composées).

4.3 Barrière unique

On fixe une **barrière** B (par exemple $B = 0{,}5$) ou on la définit comme la médiane des P_{orig} sur l'échantillon. Alors :

•Si $P_{orig}(\gamma) > B$, γ est dit **originel** (probablement sans antécédent dans l'échantillon).
•Si $P_{orig}(\gamma) < B$, γ est dit **composé** (probablement issu d'une combinaison).



Cette barrière est **constante** sur la durée de l'étude, mais elle peut évoluer très lentement à l'échelle cosmologique (car l'échantillon change).

Interprétation chimique :

•Originels : éléments primordiaux (H, He, Ne, etc.) ou molécules très stables.
•Composés : molécules formées par réaction (eau, urée, polymères).

---

5. Classification des éléments du TP_Rachid ELAÏDI

À partir des constantes typiques (simulations antérieures) et du calcul de P_{orig}, on obtient le tableau suivant (valeurs indicatives) :

Élément	P_{orig}	Nature	Dangerosité (visible)	Signature σ(ω) (rad/s_RE)
Néon (Ne)	0,9	originel	faible	aucun (gaz rare)
Hydrogène (H)	0,85	originel	modéré (explosif)	1256,6

Élément	P_{orig}	Nature	Dangerosité (visible)	Signature σ(ω) (rad/s_RE)
Eau (H_2O)	0,1	composé	nul	523,6 et 1047
Uranium 238	3,02	composé	très dangereux (radioactif)	spectre gamma complexe
Élément 114 (prédit)	0,01	très composé	extrêmement dangereux	inconnue

Interprétation : les éléments dangereux (radioactifs) sont toujours du côté composé, car ils résultent d'accumulations constructives (phases alignées) qui augmentent l'intensité.

---

3. Émergence dans le monde visible

La **signature spectrale** $\sigma(\omega)$ est obtenue par transformée de Rachid du signal $s(T) = \rho(T) e^{i\phi(T)}$. Dans le visible, elle correspond aux raies d'absorption/émission.
L'intensité I et la dangerosité (radioactivité) sont liées à la distance à la barrière du côté composé :

$$\text{Dangerosité} \propto \max(0, B - P_{orig}) \cdot I_{total}.$$



Ainsi, plus un élément est composé et plus son intensité est grande, plus il est dangereux (ex. uranium).

Interprétation physique : la radioactivité est une manifestation macroscopique d'une accumulation d'énergie programmatique (phases alignées).

---

7. Conclusion

Le formalisme mathématique présenté permet de :

•Décrire l'évolution des programmes via l'équation maîtresse à pics de Dirac.
•Définir une barrière probabiliste unique pour classer les éléments en originels/composés.
•Relier cette classification aux propriétés observables (signatures spectrales, dangerosité).
•Prédire que les éléments dangereux sont toujours composés (ex. uranium).

Ce cadre unifié, ancré dans l'arbre de Rachid modulo π et les combinaisons scalaires, constitue une théorie complète de l'émergence du visible depuis l'invisible.

Bibliographie

Travaux de l’auteur (références internes)

1.ELAÏDI, R. (2026). "Fondements axiomatiques de l'ERE".
2.ELAÏDI, R. (2026). "Programmes internes et sans-masse".
3.ELAÏDI, R. (2026). "Chocs programmatiques et équation maîtresse".
4.ELAÏDI, R. (2026). "Transitions multidimensionnelles".
5.ELAÏDI, R. (2026). "Chiralité, centre de concordance".

Références externes

6. Connes, A. (1994). Noncommutative Geometry.
7. ’t Hooft, G. (2016). The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics.
8. Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity.
9. Penrose, R. (2004). The Road to Reality.
10. Wolfram, S. (2002). A New Kind of Science.

supplément :

La barrière unique, constante à court terme mais évolutive à long terme – Référence pour tous les éléments chimiques dans un échantillon donné

Vous posez une question cruciale : comment une barrière peut être à la fois **constante** (pour un intervalle de temps donné) et **évolutive** (sur des échelles très longues) ? Et comment cette barrière unique sert de **référence** pour tous les éléments chimiques du TP_Rachid ELAÏDI, tout en reconnaissant que le monde invisible est bien plus vaste (superposition, accumulation par sommes scalaires) ?

Nous répondons en distinguant deux échelles de temps : le **temps profond local** (notre échantillon, notre présent) où la barrière est fixe, et le **temps cosmologique** (évolution de l'ERE sur des durées infinies) où la barrière se déplace. La barrière unique est alors une **fonction du temps cosmique** T_{cosmique}, mais pour un intervalle d'observation fini (celui de notre échantillon), elle apparaît constante.

---

1. Définition de la barrière unique

Soit T_{cosmique} le temps profond absolu (depuis l'origine hypothétique ou depuis un point de référence lointain). Pour chaque instant T, on définit une **barrière** $B(T)$ comme la médiane (ou un autre quantile) de la distribution des probabilités d'originalité $P_{\text{orig}}(\gamma, T)$ sur l'ensemble des programmes présents dans l'ERE à cet instant. Cette barrière est **unique** : tous les programmes s'y réfèrent.

Cependant, à l'échelle de notre échantillon (par exemple les quelques milliers d'années de la physique humaine), T varie très peu, donc $B(T)$ est **pratiquement constant**. On peut le noter B_0. C'est la valeur que l'on utilise pour classer les éléments.

Sur des échelles cosmologiques (milliards d'années), $B(T)$ peut évoluer : par exemple, à mesure que l'ERE se remplit de programmes composés, la médiane se déplace vers des valeurs plus faibles. On a donc une **dérive lente** de la barrière.

---

2. Équation d’évolution de la barrière

On peut écrire une équation différentielle pour $B(T)$ en fonction de la densité totale de programmes $\rho_{tot}(T)$ et de la densité de programmes « originels » $\rho_{orig}(T)$ (ceux avec $\rho_{orig} > B(T)$). Une forme simple :

$$\frac{dB}{dT} = \kappa(\rho_{tot} - \rho_{orig} - 21)$$

où κ est une constante de relaxation. Si plus de la moitié des programmes sont originels, B augmente (la barrière monte) ; si plus de la moitié sont composés, B diminue. Cette équation est couplée à l’équation maîtresse qui régit ρ_{orig} et ρ_{tot}.

Pour un intervalle de temps court, $\rho_{tot} - \rho_{orig}$ est quasi constant, donc B est constant. Pour des temps longs, il varie.

3. Rôle de la barrière dans la classification des éléments

Pour un élément γ donné (par exemple Néon, H_2O, U238), on calcule sa probabilité d'originalité $P_{orig}(\gamma, T)$ à l'instant T de l'échantillon. On compare à $B(T)$:

- Si $P_{orig}(\gamma, T) > B(T)$, l'élément est dit **originel** (dans cet échantillon).

- Si $P_{orig}(\gamma, T) < B(T)$, l'élément est dit **composé**.

Le Néon, ayant une forte probabilité d'être originel (car rarement combinaison), se trouve au-dessus de la barrière. L'uranium 238, très probablement composé, se trouve en dessous.

---

4. Lien avec les sommes scalaires et l'accumulation

Le monde invisible est plus vaste que notre échantillon : il contient une infinité de programmes qui se superposent et s'accumulent par **sommes scalaires** ⊕. La barrière unique n'est pas affectée par ces programmes inconnus tant qu'ils ne font pas partie de l'échantillon.

Cependant, leur existence influence l'évolution à long terme de $B(T)$ via l'équation ci-dessus (car ρ_{tot} inclut tous les programmes, connus et inconnus). Ainsi, la barrière est une **propriété émergente** de l'ensemble de l'ERE, mais nous ne pouvons l'estimer qu'à partir de notre échantillon (une approximation).

Mathématiquement, on peut écrire :

$$B_{estime}(T) = \text{médiane}\{P_{orig}(\gamma, T) \mid \gamma \in \text{échantillon}\}$$



C'est cette valeur que nous utilisons comme référence. Elle est constante sur la durée de l'étude, mais elle peut différer de la véritable barrière universelle $B_{universel}(T)$ si notre échantillon n'est pas représentatif.

5. Exemple numérique (conceptuel)

Imaginons qu'à l'instant T_0, la distribution des P_{orig} pour les programmes connus soit : {0,9 (Ne), 0,85 (H), 0,7 (He), 0,3 (C), 0,1 (H_2O), 0,02 (U238)}. La médiane est environ 0,5 (entre 0,3 et 0,7). On fixe $B_0 = 0,5$. Alors :

•Originels : Ne, H, He (car >0,5)
•Composés : C, H_2O, U238 (car <0,5)

Si l'on considère un intervalle de temps très long, disons T_1 beaucoup plus tard, l'échantillon pourrait évoluer (disparition de certains, apparition de nouveaux). La médiane pourrait alors devenir, par exemple, 0,3. La barrière aurait baissé. Mais pour l'étude à T_0, elle est fixe.

---

6. Conclusion mathématique

La barrière unique est une **fonction du temps cosmique** $B(T)$, mais pour un intervalle d'observation fini (notre échantillon), elle est considérée comme constante. Elle sert de référence pour décider si un élément est originel ou composé. L'équation maîtresse (unifiée ou simplifiée) n'est pas modifiée ; la barrière est un **post-traitement** basé sur la distribution des P_{orig} à l'instant T. Les sommes scalaires et l'accumulation de programmes invisibles affectent l'évolution à long terme de $B(T)$, mais pas la classification locale. Ainsi, on peut trancher le débat sur l'origine sans recourir au Big Bang : on utilise une barrière arbitraire (mais unique) définie par l'échantillon. Le Néon est originel, l'uranium est composé. Le monde invisible reste plus vaste, mais notre barrière en est une **projection** adaptée à notre échelle.